

Isoniazid (INH)

- ◆ Uzmite INH **1 sat prije ili 2 sata poslije jela**
- ◆ Ako vam ovaj lijek uznemiri stomak, pojedite nešto zajedno sa lijekom
- ◆ Ne trošite alkohol dok ste na INH
- ◆ Koristite Tylenol (acetaminophen) ili bilo koji drugi lijek sa acetaminophen za vrijeme dok ste na INH.
- ◆ Izbjegavajte uzimanje Maalox, Tums ili Mylanta (sredstva protiv stomačne kiseline) dva sata poslije uzimanja INH
- ◆ **Izbjegavajte** sljedeće namirnice koje mogu izazvati probleme kao što je vrućica, drhtavica ili glavobolja:
 - * Riba
 - * Kiseli kupus
 - * Tablete na bazi ljekovitog bilja (Brewer's kvasac)
 - * Suho meso
 - * Sir (stari)
- ◆ **Razgovarajte** sa TB medicinskom sestrom ako:
 - Ako ostanete u drugom stanju a uzimate INH
 - Ako izgubite apetit, osjećate mučninu ili povraćate, ako imate svijetlu stolicu, ili se osjecate umorno dok ste na INH.
- ◆ **Ostale Informacije:** _____

Ako imate ikakvih dodatnih pitanja, molimo vas nazovite TB medicinsku sestruru: _____